植 物 分 类 学 报 31(1): 70 — 71 (1993)
Acta Phytotaxonomica Sinica

北京葡萄属一新种

康木生　路端正
(北京林业大学，北京 100083)

A NEW SPECIES OF *VITIS* FROM BEIJING

KANG MU-SHENG　LU DUAN-ZHENG
(*Beijing Forestry University*, *Beijing* 100083)

Key words *Vitis*; *V. baihuashanensis*
关键词 葡萄属；百花山葡萄

百花山葡萄 新种 图 1

Vitis baihuashanensis M. S. Kang et D. Z. Lu, sp. nov.

Species *V. piasezkii* Maxim. affinis, sed foliis plerumque pedatim 5-foliolatis, foliolis graciliter longeque petiolutatis rhombiformibus apice longe acuminatis basi late cuneatis infra medium 3-partitis differt.

Frutex scandens, 15 — 20 m longus, deciduus. Ramuli teretes, rubro-brunnei, albo-pubescentes, mox glabrescentes. Capreoli apice 2-ramificantes. Folia plerumque pedatim 5-foliolata; foliola graciliter petiolulata, petiolulis 1 — 1.5 cm longis, centralia rhombiformia, 4 — 7 cm longa, 2 — 3 cm lata, infra medium 3-partita, margine grosse dentata, infima minora oblique ovata, inaequaliter 2-partita vel 2-secta, supra glabra, subtus ad nervos sparse albo-pubescentia; petioli 10 — 15 cm longi. Panicula sub fructu 7 — 10 cm longa, 3 — 5 cm lata. Baccae globosae, maturitate purpureo-nigrae, 0.5 — 0.8 cm diam.

Beijing (北京): Mt. Donglingshan (东灵山), alt. 1050 m, 1984.07.19, Lu Duan-zheng (路端正) 84089 (Holotype, BFU); Baihua Mt. (百花山), Qingzaojiagou (青枣架沟), alt. 1200 m, 1990.06.08, Lu Duan-zheng 90339.

落叶木质藤本，长 15 — 20 m。小枝圆柱形，红褐色，被灰白色柔毛，其后脱落至几无毛。卷须先端二分叉。叶通常鸟足状复叶，具 5 小叶；小叶具细柄，小叶柄长 1 — 1.5 cm，中间小叶均为菱形，长 4 — 7 cm，宽 2 — 3 cm，中部以下通常 3 深

本文承王文采、李朝銮两教授审阅，谨此致谢。
1990.09.18 收稿。

裂，边缘具粗齿，基部一对小叶斜卵形，稍小，2 深裂或全裂，上面光滑，下面沿叶脉疏被白色柔毛；总叶柄长 10 — 15 cm。圆锥花序长 7 — 10 cm，宽 3 — 5 cm。浆果球形，熟时紫黑色，直径 0.5 — 0.8 cm。

本种与复叶葡萄近似，其不同点在于本种叶通常呈鸟足状复叶，小叶5，具细长小叶柄，小叶片菱形，先端长渐尖，基部楔形，中部以下常 3 深裂，易于区别。

图 1　百花山葡萄 *Vitis baihuashanensis*